NOTE II.

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE EUGITHOPUS

PAR

W. ROELOFS.

Eugithopus nobilis, n. sp.

D'une forme ovale, couvert d'un enduit noirâtre sur le prothorax, brun-pourpre foncé sur les élytres, orné d'un dessin blanc-jaunâtre en dessus; dessous blanc-jaunâtre lavé de gris. — Long. 25 millim. (rostr. excl.).

Espèce offrant beaucoup d'analogie avec *E. elegans* mihi, par la forme et le mode de coloration, mais se distinguant surtout par la couleur du fond et la forme des taches.

Rostre de la longueur du prothorax, médiocrement arqué, épaissi à la base, avec un point assez profond entre les yeux et une ligne imprimée le parcourant jusqu'au bout. Un enduit blanc-jaunâtre qui le couvre, laisse le bout dénudé. L'espace entre les yeux et les scrobes est irrégulièrement et profondément ponctué. Les antennes sont couvertes du même enduit que le rostre. La tête est très finement ponctuée.

Prothorax faiblement arrondi sur les côtés, garni d'un enduit noirâtre, vaguement couvert d'une ponctuation peu apparente, brune sur les parties noires du fond, sa base bordée d'une ligne étroite blanc-jaunâtre, quatre lignes un peu ondulées de la même couleur vont de la base au sommet, se rapprochant un peu en avant. Ecusson blanc-jaunâtre, un peu déprimé, en triangle, arrondi au bout.

Elytres ovales, moins rétrécies en arrière que chez *E. elegans*, faiblement calleuses vers l'extrémité, finement striées, vaguement ponctuées sur les taches claires. Elles sont couvertes d'un enduit velouté d'un pourpre très-foncé, la base des intervalles des stries est garnie d'un enduit blanc-jaunâtre sur l'espace d'environ deux millimètres, la strie à côté de l'écusson en est dépourvue, la couleur claire s'étend plus en arrière sur le 3e intervalle, où elle se réunit avec celle du second intervalle, qui en est couvert à cette place et forme une ligne, d'abord droite puis se courbant, au delà du milieu des élytres vers leur bord. Une petite tache se voit enfin vers l'extrémité des élytres.

Le pygidium, d'un gris-jaunâtre, porte une ponctuation assez grosse et une carène médiane, garnie, comme l'extrémité de l'abdomen, de pilosité courte et brune.

Le dessous est d'un blanc-jaunâtre, lavé par place de gris, sa ponctuation fine est plus serrée sur les côtés et vers l'extrémité de l'abdomen. Les pattes ont la couleur du dessous; les jambes ont des côtes peu élevées et une double rangée de poils courts sur la tranche intérieure.

Un individu ♂ de Brunei, nord de Borneo, découvert par Mr. Waterstradt (collection Neervoort van de Poll).

La Haye, Novembre 1891.